



žaba



had



orliak bielohlavý



vydra riečna



ploskohlavec vodný



bobor



kačica divoká



kajmanka dravá



mlok



aligátor

Bezchvostý obojživelník s krátkym telom, širokou hlavou a skákavými zadnými nohami. Často majú silne vyvinuté zadné nohy, vďaka nim výborne skáču. Živia sa najčastejšie hmyzom.

žaba

Beznohý plaz s dlhým, valcovitým telom, pokrytým šupinami.

had

Dravý vták. Rozpätie krídel má až 2,5 metra. Najčastejšie sa vyskytuje v blízkosti jazier, riek a morského pobrežia – všade tam, kde je hojnosť rýb.

Vytvárajú páry na celý život, pričom partneri zostávajú spolu po celý rok.

orliak bielohlavý

Je to cicavec prispôsobený životu vo vode. Tvarom tela, plávacími blanami a mnohými ďalšími znakmi sa dokonale prispôsobila životu vo vode.

Je nočný živočích a loví najčastejšie v noci. Je výborný lovec, loví najmä ryby, preto výborne pláva a potápa sa. Vo vode je veľmi obratná a na súši hopká. Vyhrabáva si brloh so vchodom pod vodou.

vydra riečna

Silný, jedovatý had žijúci v Spojených štátoch amerických. Žije v bažinách, mokradiach, jazerách a pri rôznych vodných tokoch. Živí sa prevažne rybami a žabami.

ploskohlavec vodný

Je to najväčší európsky hlodavec.

Je dobre prispôsobený pohybu vo vode: plávacie blany na nohách a sploštený neosrstý chvost slúži ako kormidlo. Pod vodou vydrží až 20 minút. Staví si brlohy vyhrabané do brehov s vchodom a východom pod vodou. Alebo si postaví z hlíny a vetiev veľkú kopy, tzv. „bobří hrad“. Ohrýza kmene do kužela, a tak dokáže zoťať aj veľké stromy do hrúbky 50 cm.

bobor

Veľmi rozšírený druh vtáka.

Zdržuje sa pri stojatých i tečúcich vodách s bohatstvom vodných rastlín a pobrežných porastov na celom našom území. Pri ťahaní potravy z vody robí „stojku“, hlavu a časť tela ponorí tak, že mu vyčnieva z vody len zadná časť. Vzlieta priamo z vodnej hladiny.

Sfarbenie sa líši podľa pohlavia. Samička má nenápadné žltohnedé sfarbenie s tmavými škvrnami, samec je sfarbený pestro. Hlava a krk sú lesklozelené, dolu na krku je biely golier, hrvoľ a hrud' sú gaštanové.

kačica divoká

Sú obojživelníky, ktoré kedysi ľudia pokladali za drakov. Väčšiu časť roka prežíva vo vode alebo v jej blízkosti. Koncom jesene vychádza z vody a hľadá si v jej blízkosti skrýšu na prezimovanie, napr. pod drevom, v norách malých zvierat, v štrbinách zeme. Živí sa hmyzom, dážďovkami, slimákmi.

mlok

Korytnačka žijúca hlavne v stojatých a pomaly tečúcich vodách. Keďže nie je dobrým plavcom, vyhľadáva najmä močiare a zátoky s bahnitým dnom a brehmi, kam sa zahrabáva v čase zimovania.

Vyskytuje sa v Amerike.

Je veľmi agresívna, najmä ak sa cíti ohrozená. Živí sa hocijakým zvieratom, na ktoré si trúfne - loví ryby, mloky, žaby, mláďatá aligátora...

kajmanka dravá

Druh krokodíla. Žije v močiároch, riekach alebo bažinách, ktoré sa často kryjú s oblasťami, obývanými ľuďmi. Má veľké, tmavé, silné telo s mocnými končatinami, širokú hlavu a veľmi silný chvost. Samci väčšinou dosahujú dĺžku do 5,5 m.

Pomocou návnady vie loviť korisť, ako sú vtáky. To je dôkazom, že plazy vedú používať nástroje. Vyvážením paličky alebo vetvy na hlavách, sú schopné prilákať a uloviť vtáky, ktoré hľadajú vhodnú podstielku.

aligátor

